

بررسی تأثیر اقلیم و زمان‌های برداشت بر عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن دنایی *(Thymus daenensis)*

فرزانه بهادری^{*}، مهدی میرزا^۲

^۱*بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان ایران

^۲بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراعت کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

^{*}نویسنده مسئول: farbahadori@gmail.com

چکیده

به منظور بررسی تأثیر اقلیم و زمان‌های برداشت بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (*Thymus daenensis*) آزمایشی در سال‌های زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۷ به صورت کرت‌های خردشده در مکان در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در استان سمنان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: دو منطقه کشت شامل: (سمنان و شهرمیرزاد) به عنوان عامل اصلی و مراحل مختلف رشد گیاه در پنج سطح شامل: (رشد رویشی، پنجاگه درصد گلدهی، صد درصد گلدهی، پنجاگه درصد بذردهی و صد درصد بذردهی) نیز به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. ویژگی‌های مورد مطالعه شامل: عملکرد سرشاخه گل‌دار، درصد اسانس، عملکرد اسانس و اجزای تشکیل دهنده اسانس بود. نتایج به دست آمده نشان داد، گیاهان در منطقه شهرمیرزاد در مرحله صد درصد گلدهی، با تولید حداقل تیمول (۸۲/۷۵ درصد) و عملکرد اسانس (۲۹/۹۲ کیلوگرم بر هکتار) از نظر اقتصادی نسبت به منطقه سمنان در همین مرحله فنولوژیک (با ۶۶/۳۶ درصد تیمول و ۲۵/۳۶ کیلوگرم بر هکتار اسانس) برتری محسوسی داشتند. زمان مناسب برداشت آویشن در هر دو منطقه سمنان و شهرمیرزاد برای دستیابی به بالاترین عملکرد اسانس و تیمول در مرحله صد درصد گلدهی بود. حداقل کارواکرول (۴۰/۴۸ درصد) در مرحله رویشی و در منطقه سمنان بدست آمد و همچنین بالاترین عملکرد خشک اندام هوایی گیاه در مرحله رویشی، در هر دو منطقه سمنان (۱۳۱۳ کیلوگرم بر هکتار) و شهرمیرزاد (۱۷۲۸ کیلوگرم بر هکتار) مشاهده شد. لذا با توجه به نیاز صنایع و با توجه به ترکیب شیمیایی مورد نیاز می‌توان نسبت به برداشت آویشن دنایی در هر دو منطقه در مراحل فنولوژیک توصیه شده اقدام نمود.

کلمات کلیدی: آویشن دنایی، زمان برداشت، اسانس، تیمول، کارواکرول